



## A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA FORMAÇÃO DE ENGENHEIROS SANITARISTAS E AMBIENTAL

Bárbara Panisson Lopes<sup>1</sup>; Calina Grazielli Dias Barros<sup>1</sup>; Eduardo Augusto Putzke<sup>1</sup>; Gustavo Schefelbanis Araújo<sup>1</sup>; Thiago Augusto Formentin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universidade Federal de Santa Maria; e-mail: barbaraplopes@hotmail.com

### RESUMO

As ações de origem antrópica vem contribuindo para a degradação de diversos cursos d'água. Nesse contexto, a educação ambiental pode ser utilizada para a conscientização da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e região, no sentido de mitigar a degradação dos recursos hídricos. Entre as ações previstas no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, é possível destacar a disciplina de Avaliação da Qualidade da Água, a qual visa formar Engenheiros Sanitaristas e Ambientais capazes de avaliar as condições de cursos d'água. Assim, o objetivo do trabalho é apresentar os resultados obtidos das análises físico-químicas na Sanga Lagoão do Ouro no campus da UFSM, realizadas no âmbito da disciplina. Durante o segundo semestre de 2017 foram realizadas 5 coletas para a determinação dos teores de sólidos, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), alcalinidade, acidez, dureza, cor, turbidez, condutividade, temperatura e pH. Baseado na comparação dos resultados com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº357 de 2005, a Sanga Lagoão do Ouro enquadrou-se em Classe 4. A disciplina de Avaliação da Qualidade da Água mostrou-se uma ferramenta eficiente na capacitação dos discentes para a realização das análises e interpretação dos resultados. Serviu também de alerta para a comunidade acadêmica, dada a baixa qualidade do curso d'água.

**Palavras-chave:** Qualidade da água; CONAMA 357/2005; Análises físico-químicas; Educação Ambiental.

## THE IMPORTANCE OF THE STUDY OF WATER QUALITY IN THE EDUCATION OF SANITARY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERS



### ABSTRACT

The anthropic actions have been contributing to the degradation of several waterways. In this context, environmental education can be used to raise the awareness of the academic community of the Federal University of Santa Maria (UFSM) and region, in order to mitigate the degradation of water resources. Among the actions planned in the Sanitary and Environmental Engineering course, it is possible to highlight the subject Water Quality Assessment, which aims to train Sanitary and Environmental Engineers capable of assessing the conditions of waterways. Thus, the objective of this work is present results obtained from physicochemical analyzes at Sanga Lagoão do Ouro on the campus of UFSM, accomplished during the discipline. During the second semester of 2017, five samples were collected in order to determine the solids content, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), alkalinity, acidity, hardness, color, turbidity, conductivity, temperature and pH. Based on the comparison of the results with the Brazilian legislation, Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº357 de 2005, the watercourse called Sanga Lagoão do Ouro was classified as Class 4. The discipline of Water Quality Evaluation has proved to be an efficient educational mechanism which prepares students to perform analyses and interpret its results. It also was worn as alert for the academic community, given the poor quality of the watercourse.

**Key words:** Water quality; CONAMA 357/2005; Physicochemical Analyses; Environmental Education.

### 1 Introdução

A utilização da água pela humanidade visa atender o abastecimento das grandes cidades, atividades econômicas, agrícolas, industriais e sociais. O uso inadequado da água compromete os recursos hídricos. Atividades antrópicas, como o lançamento de efluentes nos corpos hídricos, podem influenciar negativamente o enquadramento de sua classe, segundo a Resolução do CONAMA, nº 357 de 2005.

Nesse contexto, a disciplina de Avaliação da Qualidade da Água é de grande importância na formação de engenheiros sanitaristas e ambientais, uma vez que tem o objetivo de conceituar, determinar e interpretar os principais parâmetros físico-químicos e biológicos para a caracterização de águas de abastecimento, naturais e residuais. Possuindo enfoque na importância ambiental, legislação e os principais aspectos teóricos e práticos envolvidos em suas amostragens e determinações analíticas.

Visto que, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional,

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, a disciplina de Avaliação da Qualidade da Água desperta os princípios da educação ambiental. Uma vez que os discentes entram em contato com análises dos parâmetros de qualidade, bem como suas interpretações correlacionando com os hábitos populacionais e a saúde do meio ambiente no qual estão inseridos.

Dessa forma, a Lei 9.795 de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, definindo a educação ambiental como um processo de construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial para a qualidade de vida e sustentabilidade.

Nesse panorama, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados obtidos no desenvolvimento da disciplina de Avaliação da Qualidade da Água, na qual foram determinados os seguintes parâmetros: teores de sólidos, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), alcalinidade, acidez, dureza, cor, turbidez, condutividade, temperatura e pH.

## 2 Métodos

O córrego analisado foi a Sanga Lagoão do Ouro, localizado no campus da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.

Devido a logística da disciplina, foram feitas 5 coletas em diferentes datas, a fim de analisar os parâmetros conforme a Tabela 1, utilizando os métodos descritos no APHA (2012).

**Tab. 1** Informações sobre as coletas e métodos.

Data	Parâmetro	Método
25/08	Sólidos	Gravimétrico
11/09	DBO	Winkler modificado pela azida de sódio
25/09	alcalinidade, dureza e acidez	Titulométrico
02/10	Cor, turbidez, condutividade, temperatura e pH	Colorímetro, turbidímetro, condutivímetro, termômetro, pHmetro
06/11	DQO	Titulométrico

## 3 Resultados e discussão

Os sólidos totais resultaram em 182,00 mg.L<sup>-1</sup>. Esse valor equivale ao somatório dos sólidos dissolvidos e sólidos suspensos. A concentração de sólidos suspensos foi de 11,40 mg.L<sup>-1</sup> e está

relacionada com a turbidez da água. Os sólidos dissolvidos apresentaram valor de  $170,60 \text{ mg.L}^{-1}$ , o qual influencia na cor, condutividade, alcalinidade, acidez e pH da água. Desta forma, os sólidos dissolvidos equivaleram a 93,74% dos sólidos totais presentes na sanga.

Os sólidos totais fixos apresentaram concentração de  $116,00 \text{ mg.L}^{-1}$  e os sólidos totais voláteis de  $66,00 \text{ mg.L}^{-1}$ . Os sólidos fixos representam a matéria inorgânica presente na sanga, que são as partículas de rochas, argila e siltes. Os sólidos voláteis representam a matéria orgânica presente na sanga.

Os sólidos suspensos fixos apresentaram concentração de  $2,80 \text{ mg.L}^{-1}$  e os sólidos suspensos voláteis  $8,60 \text{ mg.L}^{-1}$ . O grupo de sólidos dissolvidos fixos obteve valor de  $113,20 \text{ mg.L}^{-1}$ , enquanto que a concentração dos sólidos dissolvidos voláteis foi de  $57,40 \text{ mg.L}^{-1}$ .

O resultado da DBO foi de  $41,65 \text{ mgO}_2\text{.L}^{-1}$ . Segundo a Resolução CONAMA 357/2005, esse parâmetro enquadra-se em classe 4. Esse valor pode estar relacionado a decomposição de animais próximo ao curso d'água, matéria orgânica natural do córrego, esgotos domésticos, escoamento superficial e drenagem urbana. A DQO resultou em  $140,93 \text{ mgO}_2\text{.L}^{-1}$ . O valor da DQO mostrou que existe uma carga de compostos inorgânicos não sujeita a biodegradação aproximadamente 3 vezes maior que a carga biodegradável, representada pela DBO.

A acidez foi de  $37,00 \text{ mg.L}^{-1}$ . Ela tem origem natural por meio do gás carbônico absorvido da atmosfera resultante de matéria orgânica, ou pode ser obtida através de atividades antrópicas como despejos industriais (ácidos minerais ou orgânicos). Piveli (2005) destaca que o gás carbônico não influencia a qualidade da água sob o ponto de vista da saúde pública. Os ácidos minerais na água são manifestados através de sabor azedo em concentrações baixas.

A alcalinidade foi de  $256,3 \text{ mg.L}^{-1}$ . Seus principais componentes são os sais do ácido carbônico. Eles não representam riscos à saúde pública, mas provocam alteração no sabor. Este parâmetro está ausente na Resolução CONAMA 357/2005. Pode ser relacionado com o pH, que está presente na referida resolução.

A dureza foi de  $47,75 \text{ mg.L}^{-1}$ . Segundo Silva (2015), esse valor indica dureza moderada, que condiz com a não observação de espuma no local. A dureza tem origem natural por meio da dissolução de minerais contendo cálcio e magnésio e por atividade antrópica devido a despejos industriais. Quanto maior a dureza, menor a possibilidade de formação de espumas.

A temperatura foi de  $19,5 \text{ }^\circ\text{C}$ . Este parâmetro tem origem natural na troca de calor por radiação, condução e convecção (atmosfera e solo). O despejo de esgoto no curso d'água pode elevar o valor



deste parâmetro, servindo de indicativo de contaminação.

A condutividade elétrica do curso d'água foi de 228,9  $\mu\text{Scm}^{-1}$ . Esse parâmetro está diretamente relacionado com os sólidos dissolvidos. Um valor elevado da condutividade indica um potencial poluidor, podendo causar toxicidade de plantas e salinidade em excesso.

A turbidez resultou em 22 NTU. Esse valor enquadra-se na classe 1 da Resolução CONAMA 357/2005. Os sólidos em suspensão são responsáveis pela turbidez. Esse parâmetro pode ter origem natural e de atividades antrópicas. Quando de origem natural, são provenientes de partículas de rocha, argila e silte. Quando de origem antrópica, a turbidez pode ser advinda de despejos domésticos, industriais, erosão e microrganismos.

A cor da Sanga Lagoão do Ouro resultou em 236,6 uC. Este valor enquadra-se na classe 4 na resolução CONAMA 357/2005. Tem origem natural devido a decomposição da matéria orgânica, ou pode ter origem antrópica por meio de lançamentos de efluentes. Os sólidos dissolvidos equivaleram a 93,74% dos sólidos totais presentes na sanga. O que confirma que a cor apresenta uma classe pouco nobre. Já os sólidos suspensos são representados por 6,26%, confirmando que a água da sanga apresenta uma turbidez de classe nobre.

O pH foi de 7,27. Esse resultado enquadra-se em classe 1, segundo a Resolução CONAMA 357/2005. Segundo Jesus e Souza (2013) tem-se uma água alcalina. O pH da água depende de sua origem e características naturais, mas pode ser alterado através da adição de resíduos.

Percebeu-se que o córrego exalava um odor desagradável. As possíveis fontes do odor são matérias orgânica, águas eutrofizadas, floração de algas, fenol e cloro residual livre, metais, acidez, alcalinidade, cloreto, gases dissolvidos e efluentes industriais.

A Tabela 2 mostra os resultados em classes segundo a Resolução CONAMA 357/2005. Dentre os parâmetros analisados, somente sólidos dissolvidos, DBO, cor, turbidez e pH são previstos pela legislação, baseados nesses parâmetros a classe da Sanga Lagoão do Ouro foi enquadrada em classe 4. Nessas condições a sanga pode ter a função somente de harmonia paisagística.

**Tab. 2** Resultados

Parâmetros	Resultados	Classe
Sólidos Totais (mg/L)	182,00	-
Sólidos Suspensos (mg/L)	11,40	-
Sólidos Dissolvidos (mg/L)	170,60	Classe I
Sólidos Totais Fixos (mg/L)	116,00	-
Sólidos Totais Voláteis (mg/L)	66,00	-
Sólidos Suspensos Fixos (mg/L)	2,80	-
Sólidos Suspensos Voláteis (mg/L)	8,60	-
Sólidos Dissolvidos Fixos (mg/L)	113,20	-
Sólidos Dissolvidos Voláteis (mg/L)	57,40	-
DBO (7 dias) (mg/L)	41,65	Classe IV
DQO (mg/L)	140,93	-
Acidez (mg/L)	37,00	-
Alcalinidade (mg/L)	256,00	-
Dureza (mg/L)	47,75	-
Temperatura (°C)	19,50	-
Condutividade à 25°C (µS)	228,90	-
Turbidez (NTU)	22,00	Classe I
Cor (UC)	236,60	Classe IV
pH	7.27	Classe I

#### 4 Conclusão

A disciplina de Avaliação da Qualidade da Água possibilita adquirir conhecimento a respeito dos parâmetros e de suas respectivas técnicas de medição e interpretação de dados sobre os recursos hídricos da região.

Os parâmetros foram avaliados separadamente, com coletas destinadas singularmente para cada parâmetro e sob condições climáticas não similares. Essas condições contribuem para o aumento da incerteza dos resultados. Tendo em vista que as condições da sanga podem se alterar ao longo das semanas, o recomendado para que se obtenha uma maior proximidade dos dados com a real condição da sanga é que todos os parâmetros sejam determinados nas amostras de cada coleta. Assim, pode-se obter resultados mais precisos das alterações das características do corpo hídrico ao longo do semestre. Vale ressaltar que para fins de aprendizagem das técnicas de análises laboratoriais, essa lacuna temporal das análises não influenciou negativamente na capacitação dos discentes. Mesmo com o conjunto limitado de



amostras e parâmetros analisados, pode-se constatar que a sanga apresenta uma classe insatisfatória.

É necessário que pesquisas mais abrangentes sejam conduzidas ao longo dos corpos hídricos que envolvem o campus da UFSM. É importante que se tenha um maior conhecimento a respeito das condições dessas águas e que todas as fontes de contaminação sejam monitoradas. Uma alternativa viável para melhorar as condições da sanga seria cessar as emissões de efluentes provindos da universidade e bairros próximos.

### Referências

American public health association (APHA). (2012). Standard methods for the examination of water and wastewater. 22 nd ed., Washington, DC.

Conama – Ministério do Meio Ambiente (2005). Resolução 357. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/re/res05/res35705.pdf>. Acesso em: 15/11/2017.

Piveli, R; kato, M (2006). Qualidade da água e poluição: aspectos físico-químicos. São Paulo: ABES.

Quege, K. E.; Siqueira, E. Q. (2005). Avaliação Da Qualidade

Da Água No Córrego Botafogo Na Cidade De Goiânia-GO. 23º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental.

Sabesp (1977) – Norma técnica interna. NTS 004: DQO - Demanda Química de Oxigênio. São Paulo, SP. 8p.

Silva, C. M. da (2015). Ocupação irregular de região de nascente e binterferência na qualidade da água no Rio do Campo em Campo Mourão-PR. 2015.

Von Sperling, M. (1996). Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Editora UFMG.